



DUALZinc

50% ZnO

EL ZINC INTELIGENTE DE MAYOR
CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO



DUALZinc®
50% ZnO

Composición Garantizada

Ingredientes Activos	%P/V
ZnO	50
EDTA	7
Diluyentes y acondicionadores	43
Total	100

Fecha de fab. y lote:
Fecha de caducidad: A 2 años de su fab.
Contenido Neto: 1 L
BENAI AH AGRUM S DE RL DE CV
www.benaiahagrum.com
Montemby, Nuevo León
Tel. 8183851476

Zinc con suministro Inteligente:

1. Entrega inmediata.
2. Entrega progresiva

PRESENTACION



1L



20L



DUALZinc



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Fertilizante líquido constituido por nanosuspensiones de EDTA-Zinc y ZnO. La confluencia de las estrategias de conjugación de Zinc, así como de su formato nanotecnológico, resultan no solo en tener al Zinc de la más alta concentración en el mercado sino además de representar un suministro/entrega inteligente, al conjugar 1.- entrega inmediata (absorción instantánea) y 2.- entrega progresiva (absorción prolongada). Está diseñado para prevenir y corregir las deficiencias crónicas y agudas de Zinc de cualquier cultivo.



COMPATIBILIDAD

DUALZinc es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Ante cualquier duda recomendamos hacer prueba de compatibilidad previa. No mezcle DUALZinc con productos hechos a base de calcio y/o Alcalinos.



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco (no más de 45°C), bien ventilado y lejos de los rayos del sol.

Benaiah Agrum garantiza la calidad impoluta de este producto. Debido a que el almacenamiento, transporte y aplicación están fuera de nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados, ya sea que se utilice o no de acuerdo con las instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

	%P/V
ZnO	50%
EDTA	7%
Diluyentes y acondicionadores	43%
TOTAL	100

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Época de aplicación	
Tubérculos	1-4 ml / 1L de agua.	
Forraje	3 L / Ha.	
Hortalizas	2-3 ml / 1L de agua.	Para deficiencias agudas realizar 2 aplicaciones con intervalo de 5 días. Deficiencias crónicas realizar 1 aplicación cada 15 días durante todo el desarrollo, en etapas críticas usar la dosis alta.
Frutales	2-3 ml / 1L de agua.	
Ornamentales	1-4 ml / 1L de agua.	
Espicias	1-2 ml / 1L de agua	



FORMA CORRECTA DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

